

Hable con su proveedor de atención médica si cree que la PrEP podría ser adecuada para usted. La PrEP puede ser recetada por cualquier proveedor de atención médica con licencia para emitir recetas.

Antes de comenzar la PrEP debe hacerse una prueba del VIH para asegurarse de que no lo tenga.

Deberá volver a ver a su proveedor de atención médica:

- De manera rutinaria, como se recomienda para las visitas de seguimiento, pruebas del VIH y surtidos de medicamentos o inyecciones de la PrEP.
- Si presenta algún efecto secundario que se agrava o no desaparece mientras toma la PrEP.

Si no tiene un proveedor de atención médica, visite www.prelocator.org.

Hable con su proveedor de atención médica si planea faltar a una cita para la inyección de la PrEP, tiene dificultad para acordarse de tomar las pastillas de la PrEP según las indicaciones o desea dejar de recibir la PrEP.

La PrEP está cubierta por la mayoría de los programas de seguro y planes estatales de Medicaid. También es posible que reciba asistencia para pagar el copago por parte de los fabricantes del medicamento o de fundaciones de defensa de los pacientes.



El programa *Ready, Set, PrEP* provee la PrEP sin costo a aquellos que reúnen los requisitos. Obtenga más información en www.readysetprep.hiv.gov.

ViiConnect ofrece un programa para ayudar a los pacientes a pagar por la PrEP. Obtenga más información en www.viiconnect.com.

Si no tiene seguro de salud, su proveedor de atención médica puede dirigirlo a programas de asistencia para los medicamentos que pueden ayudar con el pago de la PrEP.

Para obtener más información también puede comunicarse con su departamento de salud local y con organizaciones de servicios relacionados con el VIH/SIDA.

Visite www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/rep/paying-for-prep para obtener más información sobre los programas de asistencia para la PrEP.



La PrEP puede ayudar a protegerlo si NO tiene el VIH y está en ALGUNA de las siguientes situaciones.

Ha tenido relaciones sexuales anales o vaginales en los últimos 6 meses y, además:

- tiene una pareja sexual con el VIH (especialmente si no se sabe su nivel de carga viral o si es detectable),
- no ha usado condones con constancia, o
- se le ha diagnosticado una ETS en los últimos 6 meses.

Se inyecta drogas y, además:


- se inyecta drogas con alguien que tiene el VIH, o
- comparte las agujas, jeringas u otros implementos de inyección de drogas (por ejemplo, las cocinas).

Le han recetado la PEP (profilaxis posexposición) y, además:

- indica tener un comportamiento continuo de riesgo, o
- ha usado la PEP múltiples veces.

Si tiene una pareja con el VIH y está considerando quedar embarazada, hable con su proveedor de atención médica acerca de la PrEP si todavía no la está tomando.

2



¿Qué es la PrEP?

La PrEP (profilaxis preexposición) pueden ser en forma de pastillas o inyecciones que reducen sus probabilidades de contraer el VIH.

- La PrEP puede detener la propagación del VIH por todo su cuerpo.
- La PrEP es mucho menos eficaz cuando no se toma según las indicaciones.

Recuerde, la PrEP lo protege contra el VIH, pero no contra otras ETS, ni tampoco previene el embarazo.



1



Para obtener más información sobre el VIH, incluida la PrEP, visite www.cdc.gov/hiv/spanish/basics.

Para encontrar un proveedor de PrEP cercano a usted, visite www.preplocator.org.



¡Escanea para obtener más información!

PrEP

¿Es usted VIH negativo, pero está en riesgo de contraer el VIH? La PrEP puede mantenerlo libre del VIH.

